

L'Ossigenazione Biocatalitica Jacquier

Attività terapeutica

Azione generale

Posologia

Dr. Max. BERGER

Otorinolaringoiatra

Articolo apparso su "Le Journal de Medicine de Bordeaux"

INDICAZIONI GENERALI E PARTICOLARI

In generale:

- In numerose malattie microbiche o virali ad andamento persistente o recidivante.
- Nelle malattie metaboliche e/o dell'assimilazione.
- Nelle malattie allergiche e/o di sensibilizzazione.
- Nell'affaticamento generale (surmenage, stress, ecc.) fisico e nervoso

In particolare:

1-INFEZIONI IN GENERALE, SOPRATTUTTO PERSISTENTI E RECIDIVANTI:

- ~ foruncolosi
- ~ colibacillosi

2- AFFEZIONI PNEUMO-POLMONARI ACUTE E

CRONICHE::

- ~ tubercolosi
- ~ atelectasia
- ~ asma

3- INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA:

a) disturbi restrittivi:

- ~ sclerosi
- ~ resezione polmonare
- ~ sequele di pleuriti
- ~ malattie professionali, silicosi, ecc.
- ~ fratture delle costole, scoliosi

b) disturbi ostruttivi:

- ~ bronchite cronica
- ~ dilatazione dei bronchi
- ~ bronchiectasia
- ~ broncorrea
- ~ bronchiolite dei bambini
- ~ asma inveterata
- ~ enfisema
- ~ mucoviscidosi

4- AFFEZIONI CARDIACHE, CARDIO-POLMONARI E CIRCOLATORIE

a) cardiopatie vascolari - cardiopatie ventricolari

- ~ scompenso cardiaco
- ~ edema polmonare cardiogeno
- ~ embolia polmonare

b) sindromi ischemiche

- ~ ischemia del miocardio
- ~ infarto del miocardio
- ~ ischemia renale
- ~ ischemia cerebrale
- ~ ischemia periferica (degli arti inferiori)

e) arteriosclerosi

- ~ ipertensione arteriosa

d) tachicardia e palpitazioni

5- AFFEZIONI EPATO-DIGESTIVE

- ~ Insufficienza epatica
- ~ Azotemia
- ~ Ipercolesterolemia
- ~ Glicemia

6- DISTURBI NEURO-VEGETATIVI E MALATTIE ENDOCRINE

7-INTOSSICAZIONI DA DIPENDENZA

~ alcool, tabacco e stupefacenti

8- SEQUELE DI INTOSSICAZIONI DIVERSE

~ ossido di carbonio

~ farmaci e prodotti chimici (es. fosforo)

9- SINDROMI NEURO-PSICHICHE

~ stress, disturbi del comportamento. surmenage
psichico e nervoso nel mondo del lavoro.

10 - SENESCENZA

~ nei soggetti in cui la produzione energetica di base
è precocemente o anormalmente abbassata

A - *CHIRURGIA*

cicatrizzazioni diverse (ustioni, piaghe,
cicatrizzazioni post-operatorie, rallentamenti
nel consolidamento delle fratture).

~ indicazioni pre-operatorie: per favorire l'emostasi.

~ Indicazioni post-operatorie: per prevenire le
complicazioni polmonari.

B - *GINECOLOGIA*

Disturbi neuro-vegetativi ed endocrini:

~ disturbi mestruali e della menopausa

~ cerviciti

~ vaginiti

~ metriti

~ endometriti

~ annessiti

C - *OTORINOLARINGOIATRIA*

~ Infezioni naso-sinusali

~ Allergie naso-sinusali

~ Faringiti

~ Laringiti

~ Tracheiti

~ Afezioni nasali dell' infanzia

~ Fragilità capillare nasale

D - *PEDIATRIA*

afezioni polmonari

~ asma bronchiale

~ tubercolosi

~ malattie contagiose (morbillo, pertosse. ecc.)

~ cardiopatie

~ diversi "terreni" a rischio (allergici, linfatici)

POSOLOGIA

Come terapia coadiuvante o indipendente, in inalazioni di derivati di ossido di alfapinene. La cura è di 30 giorni (eventualmente ripetibile dopo una settimana di pausa) in ragione di una o tre inalazioni al giorno della durata variabile tra i 6 e i 12 minuti in riferimento alle cause, all'evoluzione ed alla gravità della patologia

AFFEZIONI ACUTE:

La cura sarà iniziata ai primi sintomi (e portata avanti per 30 giorni al fine di consolidare la guarigione che, a volte, avviene sin dalle prime sedute) così come segue:

ESEMPIO:

o meglio

- 2 inalazioni di 10 o 12 minuti al giorno
- 3 inalazioni di 6 o 8 minuti al giorno

AFFEZIONI CRONICHE:

Cure a cicli di 30 giorni da effettuarsi nel seguente modo:

ESEMPIO: - 3 inalazioni di 6 minuti al giorno (soluzione più efficace) *oppure* - 2 inalazioni da 8 a 10 minuti al giorno
o ancora - 1 inalazione di 12 minuti al giorno

Fermarsi 7 giorni tra un ciclo e l'altro, fatta eccezione quando si hanno crisi di eliminazione o di disintossicazione durante le quali è preferibile non interrompere la cura.

DEPRESSIONE NERVOSA GRAVE:

Cure di 30 giorni in ragione di una inalazione quotidiana con una pausa di 7 giorni tra un ciclo e l'altro. Sin dalla seconda serie, il medico curante potrà ritenere utile iniziare a ridurre le dosi dei sedativi e degli antidepressivi.

IN CHIRURGIA COME PREVENZIONE DELLE COMPLICAZIONI POLMONARI:

Da 6 a 8 inalazioni della durata variabile da 6 a 12 minuti prima dell'intervento, da 10 a 14 inalazioni dopo l'operazione.

CONTROINDICAZIONI

Anche se non si tratta di una controindicazione tassativa, non è bene consigliare delle sedute di ossigenazione biocatalitica agli epilettici.

PRECAUZIONI

Nei casi di spasmofilia, tetania, cardiopatia:
controllare che il paziente non faccia delle iperventilazioni polmonari durante le sedute. E' quindi consigliabile iniziare con delle sedute brevi, per esempio:

